



核准日期：2022年11月13日



首次使用本品必须在医生的监督下，并应在具备一定医疗设备条件下进行，以确保一旦出现过敏反应（包括附加注射的过敏反应）可立即予以治疗。此后患者可进行自我注射，但应清楚发生过敏反

应最常见不良反应为局部注射部位疼痛而短暂的反应，包括红肿、瘙痒及肿胀。临床试验中，多次注射200.25mg及以上剂量时发生中

度过敏反应。过敏反应包括首次剂量发生过敏反应、继发性过敏反应、过敏反应加重。

余赛博®



### 【用法用量】

本品为皮下注射剂，应在医生的指导下使用。首次使用本品必须在医生的监督下，并应在具备一定医疗设备条件下进行，以确保一旦出现过敏反应（包括附加注射的过敏反应）可立即予以治疗。此后患者可进行自我注射，但应清楚发生过敏反应。本品应在冷藏条件下保存，使用前应恢复到室温。

### 【不良反应】

最常见不良反应为局部注射部位疼痛而短暂的反应，包括红肿、瘙痒及肿胀。临床试验中，多次注射200.25mg及以上剂量时发生中度过敏反应。过敏反应包括首次剂量发生过敏反应、继发性过敏反应、过敏反应加重。

### 【禁忌】

对本品任何成分过敏者禁用。

### 【注意事项】

本品为皮下注射剂，应在医生的指导下使用。首次使用本品必须在医生的监督下，并应在具备一定医疗设备条件下进行，以确保一旦出现过敏反应（包括附加注射的过敏反应）可立即予以治疗。此后患者可进行自我注射，但应清楚发生过敏反应。本品应在冷藏条件下保存，使用前应恢复到室温。

### 【规格】

本品规格为0.5mL/支，每盒1支。

### 【贮藏】

本品应在冷藏条件下保存，使用前应恢复到室温。

### 【包装】

本品包装为0.5mL/支，每盒1支。

### 【有效期】

本品有效期为24个月。

### 【生产企业】

企业名称：余赛博生物制药有限公司  
注册地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1212号  
生产地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1212号

### 【临床试验】

本品在临床试验中，多次注射200.25mg及以上剂量时发生中度过敏反应。过敏反应包括首次剂量发生过敏反应、继发性过敏反应、过敏反应加重。

### 【上市后监测】

本品上市后，应继续监测不良反应。如发现新的不良反应，请及时报告。

### 【其他】

本品为皮下注射剂，应在医生的指导下使用。

### 【附注】

本品为皮下注射剂，应在医生的指导下使用。首次使用本品必须在医生的监督下，并应在具备一定医疗设备条件下进行，以确保一旦出现过敏反应（包括附加注射的过敏反应）可立即予以治疗。此后患者可进行自我注射，但应清楚发生过敏反应。本品应在冷藏条件下保存，使用前应恢复到室温。

### 【说明书】

本品说明书详细描述了本品的用法用量、不良反应、禁忌、注意事项、规格、贮藏、包装、有效期、生产企业、临床试验、上市后监测、其他、附注。

### 【附录】

本品附录包括本品的临床试验数据、上市后监测数据、其他相关资料。

### 【参考文献】

本品参考文献包括本品的临床试验文献、上市后监测文献、其他相关资料。

### 【索引】

本品索引包括本品的临床试验索引、上市后监测索引、其他相关资料索引。

### 【目录】

本品目录包括本品的临床试验目录、上市后监测目录、其他相关资料目录。

### 【附录】

本品附录包括本品的临床试验附录、上市后监测附录、其他相关资料附录。

### 【参考文献】

本品参考文献包括本品的临床试验参考文献、上市后监测参考文献、其他相关资料参考文献。

### 【索引】

本品索引包括本品的临床试验索引、上市后监测索引、其他相关资料索引。

